

Przypadek 65-letniego **pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek**

z poradni prof. dr hab. n. med. Andrzeja Oko



● Marzec 2022 r.



Pan Radosław, 65 lat
przedsiębiorca

- Choruje na nadciśnienie tętnicze.
- Jest po przebytych pełnościennym zawale mięśnia sercowego.



Dotychczasowe leczenie

- Kłopidogrel
- Rywaroksaban
- Bisoprolol
- Ramipryl
- Atorwastatyna



Wyniki badań:

- w badaniu EKG rozpoznano **migotanie przedsionków**
- w badaniu echokardiograficznym stwierdzono **zmniejszenie frakcji wyrzutowej serca do 50%**
- **stężenie kreatyniny w surowicy** 161 $\mu\text{mol/l}$
- **eGFR** – 40 ml/min/1,73 m²
- **badanie USG jamy brzusznej** wykazało dysproporcję w wymiarach nerek:
 - » nerka lewa dł. 8 cm z wąską warstwą korową 7 mm
 - » nerka prawa dł. 12 cm, z warstwą korową 14 mm

● Maj 2022 r.

Stwierdzono dalszy **wzrost stężenia kreatyniny w surowicy** do 202 $\mu\text{mol/l}$, eGFR 31,0 ml/min/1,73 m².

● Czerwiec 2022 r.

Do terapii włączono **dapagliflozynę w dawce 10 mg.**



● Sierpień 2022 r.

Stężenie kreatyniny w surowicy obniżyło się do 182,4 $\mu\text{mol/l}$, eGFR 33 ml/min/1,73 m².

● Grudzień 2022 r.

Dalszy spadek stężenia kreatyniny w surowicy do 151,2 $\mu\text{mol/l}$, eGFR 38,3 ml/min/1,73 m². Chory dobrze toleruje przyjmowany lek.



Jedyna flozyna z 3 różnymi wskazaniami i najszerszą refundacją¹⁻⁴

Inicjuj u pacjentów z eGFR $\geq 25 \text{ ml/min/1,73 m}^2$.¹



CENA DLA PACJENTA

53,44zł



CUKRZYCA TYPU 2¹



NIWYDOLNOŚĆ SERCA¹



PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK¹

1. FORXIGA®, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 03.02.2023. 2. Jardiance 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 06.09.2022. 3. Invokana 100 mg, 300 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 04.03.2022 4. Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.



Układy i narządy	Bardzo często	Często ^a	Niezbýt często ^a	Rzadko	Bardzo rzadko
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze		zapalenie sromu i pochwy, zapalenie żołądka i jelit, powiększenie zakażenia narządów płciowych ^{1,4} , zakażenia układu moczowego ^{3,4}	zakażenia grzybicze ²		martwice zapalenie powięzi kroczca (zgorzel Fourniera) ^{3,4}
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania	hipoglikemia (podczas jednoczesnego stosowania z SU lub insuliny) ⁶		niedobór płynów ^{3,4} wzmoczone pragnienie ²	cukrzyca kwasica ketonowa (gdy lek jest stosowany w cukrzycy typu 2) ^{3,4}	
Zaburzenia układu nerwowego		zawroty głowy			
Zaburzenia żołądka i jelit			zaparcia ² suchość w ustach ²		
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej		wysypka ²			obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej		ból pleców ²			
Zaburzenia nerek i dróg moczowych		dysuria wielomocz ^{2,4}	nykturia ²		cewkowo-śródmiaższowe zapalenie nerek
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi			świąd sromu i pochwy ² świąd narządów płciowych ²		
Badania diagnostyczne		zwiększony hematokryt ⁴ obniżenie nerkowego klirensu kreatyniny podczas leczenia początkowego ⁵ dyslipidemia ³	zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi podczas leczenia początkowego ^{3,5} zwiększenie stężenia mocznika we krwi ² zmniejszenie masy ciała ²		

[illegible]